

EPIDEMIOLOGÍA

Perfil epidemiológico bucodental en la clínica odontológica de adultos de la Universidad Antonio Nariño, Neiva 2013 – 2014

Laura Beltran Pineda

Estudiante Facultad de Odontología, Universidad Antonio Nariño, seccional Neiva.

Liceth Hermosa Sarria

Estudiante Facultad de Odontología, Universidad Antonio Nariño, seccional Neiva.

Carlos Andrés Robles Ávila

Odontólogo. Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud.

Profesor Facultad de Odontología, Universidad Antonio Nariño seccional Neiva.

Claudia Lorena García Rojas

Fisioterapeuta. Especialista en Epidemiología.

Profesora Facultad de Odontología, Universidad Antonio Nariño, seccional Neiva.

email: claudia_garcia@uan.edu.co

Resumen

Objetivo: Determinar el perfil epidemiológico bucodental de los usuarios atendidos en la clínica odontológica de adultos de la universidad Antonio Nariño, seccional Neiva para los periodos 2013-2014. **Materiales y métodos:** Se llevó a cabo un estudio observacional de tipo descriptivo, comprendido por 203 historias clínicas seleccionadas aleatoriamente del archivo activo de usuarios que asistieron a la clínica odontológica de adultos de la universidad Antonio Nariño sede Neiva durante estos periodos. Se estudiaron variables de caracterización sociodemográficas con cada uno de los diagnósticos en salud oral. Los datos fueron codificados mediante un instrumento diseñado en formato Microsoft Excel® donde se registró variables de caracterización sociodemográfica como edad, sexo, nivel de escolaridad, EPS, estado civil, localidad, nivel socioeconómico y los diferentes diagnósticos por especialidad: cráneo mandibulares, tejidos duros y blandos, dentales, periodontales, endodónticos y de articulación temporomandibular (ATM). Las variables se describieron en frecuencias y las correlaciones se realizaron con prueba Chi cuadrado (χ^2). **Resultados.** El 46% de la muestra fueron mayores a 50 años de edad, 66,5% pertenecían al sexo femenino, 41,8% se encontraban solteros, el nivel educativo más frecuente fue bachiller con 38,9%, el 74,3% pertenecía nivel socioeconómico medio y el 66,9% pertenecientes al régimen contributivo. El análisis bivariado mostró que existe una relación estadísticamente significativa de edad ($p=0,04$), estado civil ($p=0,03$) y nivel educativo

($p=0,02$) con los diagnósticos craneomandibulares donde se obtuvo que ausencias dentales y edentulismo total tiene relación con las personas mayores de 50 años, soltero y con bachiller y primaria. En los diagnósticos dentales se encontró una relación estadísticamente significativa entre la caries de dentina con el nivel socioeconómico medio ($p=0,009$). En los diagnósticos periodontales, la gingivitis asociada a placa bacteriana estaba relacionada con pertenecer al nivel socioeconómico medio ($p=0,00$). La relación entre los diagnósticos endodónticos fue estadísticamente significativa con el nivel socioeconómico medio y periodontitis irreversible ($p=0,01$). Revisando la morbilidad Oral se identificó que la caries de dentina fue la primera causa de morbilidad con 24,6% seguido de las ausencias dentales con 19,2% y 14,2% la gingivitis asociada a placa bacteriana, el 4 y 5 lugar fue ocupado por la periodontitis crónica leve con 10,8% y periodontitis crónica severa 10,3%, respectivamente. **Conclusiones:** La caries sigue siendo la principal causa de morbilidad a nivel odontológico y se ve asociado al nivel social medio y bajo. Se observa una notoria tendencia femenina a consultar más que los hombres. Se recomienda evaluar políticas de salud pública en salud Oral, ya que las principales patologías presentadas en el presente trabajo se registran en los diferentes perfiles epidemiológicos a nivel Colombia y sur América.

Palabras Claves: Perfil de salud, Diagnóstico bucal, Epidemiología, Salud oral, Caries dental.